

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

Para adultos con hepatitis C
crónica de los genotipos 1-6

CÓMO TRATAR SU HEPATITIS C CON **EPCLUSA**

Por favor, vea los Datos
Importantes de EPCLUSA, incluida
la **Advertencia importante sobre
la reactivación de la hepatitis B**
en la página 8.




EL PASO CORRECTO

¡Hola! Cuidar de su hepatitis C es un paso importante en su recuperación y en sus objetivos de salud.

Cualquier persona puede contraer la hepatitis C y todos merecen la oportunidad de curarse.

Es posible que su proveedor de atención médica elija EPCLUSA (EP-CLU-SA) como el tratamiento para la hepatitis C más adecuado para usted. En la siguiente página, vea algunos de los motivos de esta elección.



La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

¿Qué es EPCLUSA?

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (Hep C) crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada).

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante** en la página 8.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

¿POR QUÉ EPCLUSA?



No importa si acaba de descubrir que tiene hepatitis C o si lo ha sabido desde hace años, EPCLUSA podría ser su tipo de cura.



Hay seis tipos principales de hepatitis C, conocidos como genotipos. EPCLUSA puede funcionar para todos ellos con una tasa de curación global del 98%*.



EPCLUSA puede tratar su hepatitis C aun si tiene daños hepáticos.

*En estudios realizados en pacientes con genotipos 1-6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido la hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante y después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después de tomar EPCLUSA.

EN SU HORARIO

EPCLUSA puede ser conveniente de tomar puesto que el tratamiento es un único comprimido una vez al día. También viene en un frasco de comprimidos regular lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el bolsillo. Esto significa que puede ser discreto.

También puede tomar EPCLUSA con o sin alimentos. Por tanto, si se salta comidas o no siempre come en un horario establecido, todavía puede tomar el medicamento.

EPCLUSA solo se toma durante 12 semanas. Es importante tomar todos los comprimidos, según le haya indicado su proveedor de atención médica, y mantener el tratamiento durante el tiempo indicado.



¿Necesita más apoyo durante el tratamiento?

Hable con un educador de EPCLUSA o enfermero(a) llamando al **1-844-4-EPCLUSA** (1-844-437-2587)



El tamaño del comprimido no es el real.

CÓMO MANTENERSE CURADO

EPCLUSA tiene altas tasas de curación pero no puede protegerlo de futuras reinfecciones.

Recuerde, alguien que conoce podría tener hepatitis C sin mostrar ningún síntoma.

Es por eso que evitar actividades, tales como compartir agujas y otro equipo para la administración de drogas, puede ayudarle a proteger su cura.



¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir EPCLUSA?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir EPCLUSA? (continuación)

- **Informe a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico sobre todos los medicamentos que usa**, incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

¿TIENE PREGUNTAS?

Su proveedor de atención médica puede responder las preguntas que tenga sobre la hepatitis C y EPCLUSA, pero a continuación aparecen algunas hay preguntas que posiblemente tenga ahora mismo:

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir EPCLUSA?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos metadona, medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios. Además, infórmele si ha tenido problemas de adicción.



Mi receta médica de EPCLUSA se surte en una farmacia especializada. ¿Qué es una farmacia especializada?

Una farmacia especializada le envía directamente las recetas médicas a usted o a su proveedor de atención médica, a diferencia de una farmacia normal.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?

Los efectos secundarios graves también pueden incluir:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante** en la página 8.



¿Qué ocurre si no puedo pagar el tratamiento?

Si reúne los requisitos, es posible que solo tenga que pagar \$5 por copago. Llame al **1-855-7-MYPATH** (1-855-769-7284) para hablar con un navegador del programa EPCLUSA Support Path® para ver qué tipo de opciones podrían estar disponibles para usted. Aplican restricciones.

¿Por qué es importante tomar EPCLUSA durante el período de tiempo establecido?

El virus de la hepatitis C fabrica cada día billones de copias de sí mismo en su cuerpo. Mantener el tratamiento con EPCLUSA durante el tiempo indicado le ofrece la mejor oportunidad de luchar contra el virus. Es importante que no se salte ni omita ninguna dosis de EPCLUSA durante el tratamiento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA? (continuación)

- Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSA y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: se desmaya o está a punto de desmayarse, mareos, aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.
- Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio.


Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios.

Se le anima a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta médica a la FDA. Visite www.FDA.gov/medwatch, o llame al 1-800- FDA-1088.

¿TIENE PREGUNTAS?

¿Qué ocurre si me salto una dosis de EPCLUSA?

Es importante tomar EPCLUSA tal como le haya indicado su proveedor de atención médica. Si se salta una dosis, asegúrese de tomar EPCLUSA al día siguiente. Nunca tome más de un comprimido de EPCLUSA al día. Si toma demasiado EPCLUSA, llame a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato al Departamento de Emergencias más cercano.



El tamaño del comprimido no es el real.

¿Cómo evitar contraer de nuevo el virus de la hepatitis C?

La hepatitis C se contagia principalmente mediante el contacto sanguíneo. Compartir agujas o equipo para drogas, mantener relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis C o usar un equipo de tatuaje antihigiénico son todas ellas actividades que pueden aumentar su riesgo de contraer de nuevo el virus de la hepatitis C.

¿Qué es EPCLUSA?

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (Hep C) crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada).

¿Cómo sé qué que estoy curado de la hepatitis C?



Tres meses después de completar el tratamiento, su proveedor de atención médica le hará un análisis de sangre para asegurarse de que la cantidad de virus de la hepatitis C que tiene en el organismo es indetectable. Una vez que se haya curado, es importante saber que seguirá dando positivo para los anticuerpos de la hepatitis C. Aunque no hay ninguna cura garantizada para la hepatitis C, EPCLUSA tiene una tasa general de curación del 98% en todos los genotipos principales. Si no está curado, hable con su proveedor de atención médica sobre los siguientes pasos a tomar.



Vea las preguntas más frecuentes en [EPCLUSA.com](https://www.epclusa.com).

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido la hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante y después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después de tomar EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante** en la página 8.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

AYUDA EN EL CAMINO

Pregunte a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre la hepatitis C o EPCLUSA. También puede recibir apoyo confidencial en la Línea de educación sobre EPCLUSA.



Hable con un educador de EPCLUSA:
1-844-4-EPCLUSA (1-844-437-2587)

EDUCADORES DE EPCLUSA

Los educadores de EPCLUSA ofrecen información y recursos y pueden conectarlo con más apoyo.

APOYO POR PARTE DE ENFERMEROS(AS)

Hay enfermeros(as) disponibles para preguntas clínicas sobre la hepatitis C y su tratamiento*.

*El apoyo por parte de enfermeros(as) no sustituirá las conversaciones con su proveedor de atención médica.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

Este programa opcional ofrece recordatorios personalizados y apoyo para satisfacer sus necesidades.



NOTAS

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante sobre la reactivación de la hepatitis B** en la página 8.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

C.U.R.E.



Para obtener más información sobre por qué es importante tratar la hepatitis C, visite HepCVideo.com para ver un video y lo que significa C.U.R.E.

Por favor, vea los Datos Importantes, incluida la **Advertencia Importante sobre la reactivación de la hepatitis B** en la página 8.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba tres meses después de terminar el tratamiento.



(ep-CLU-sa)

INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

La reactivación del virus de la hepatitis B:

Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante o después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Su proveedor de atención médica le monitoreará si está en riesgo de que se le reactive el virus de la hepatitis B durante y después de suspender EPCLUSA.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

• Aquellos en la sección “Información más importante sobre EPCLUSA”.

• **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta, lo cual en algunos casos ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se toma amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Consiga ayuda médica inmediatamente si toma amiodarona junto con EPCLUSA y presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- se desmaya o está a punto de desmayarse
- mareos o aturdimiento
- no se siente bien
- debilidad
- cansancio extremo
- disnea
- dolor en el pecho
- confusión
- problemas de memoria

Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA

incluyen: dolor de cabeza y cansancio en adultos y niños de 6 años de edad y mayores. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se usa con ribavirina, en adultos con cirrosis descompensada son: cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA en niños menores de 6 años son vómitos y problemas por escupir el medicamento.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre EPCLUSA y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica acerca de su afección y su tratamiento.

ACERCA DE EPCLUSA

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos y niños de 3 años de edad o más que tienen la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se utiliza junto con ribavirina. EPCLUSA contiene los dos medicamentos: sofosbuvir y velpatasvir. Se desconoce si EPCLUSA es seguro y eficaz en niños menores de 3 años.

ANTES DE TOMAR EPCLUSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Ha tenido alguna vez la hepatitis B
- Tiene problemas de hígado distintos de la hepatitis C
- Ha tenido un trasplante de hígado
- Tiene problemas renales o está en diálisis
- Tiene el VIH-1
- Está embarazada o amamantando o planea quedar embarazada o amamantar
 - Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma:

- Mantenga una lista que incluya todos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas, y enséñesela a su proveedor de atención médica.
- EPCLUSA y determinados medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de la información importante sobre EPCLUSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.
- Visite EPCLUSA.com o llame al 1-844-4-EPCLUSA.
- Para obtener información sobre posibles ahorros, llame al 1-855-7-MYPATH o visite EPCLUSA.com.



EPCLUSA, el logotipo de EPCLUSA, SUPPORT PATH, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2021 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. EPCC0687 08/21