



Incluya el inicio del tratamiento en su

LISTA DE HOY



Pacientes reales que han sido compensados por Gilead.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA **incluidas las Advertencias Importantes sobre la reactivación de la hepatitis B.**

Usted merece una cura. EPCLUSA puede ayudarlo a conseguirlo.

¡Felicitaciones! Usted ha movido la cura de la hepatitis C de su lista de cosas por hacer a su lista de hoy. Este folleto está diseñado para ser una guía cuando comience el tratamiento con EPCLUSA, por lo que debe tenerla a la mano durante todo el proceso.

Aquí indicamos lo que debe esperar con EPCLUSA:

- PORCENTAJE DE CURACIÓN DEL 98%***
- UN COMPRIMIDO**
- UNA VEZ AL DÍA DURANTE 12 SEMANAS**

* Promedio en estudios realizados en pacientes con hepatitis C con genotipos 1-6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

¿Qué es EPCLUSA?

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (hep C) crónica (de larga duración), genotipos 1-6, con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se utiliza junto con ribavirina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, entre otros:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de comenzar el tratamiento con EPCLUSA, el proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si existe una infección por hepatitis B. Si alguna vez usted ha tenido hepatitis B, este virus podría reactivarse durante el tratamiento con EPCLUSA y después. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después del tratamiento con EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos importantes de EPCLUSA, incluidas las [Advertencias importantes](#).



Puse la cura de la hepatitis C en mi lista de hoy y solamente me gustaría haberlo hecho antes.

Brittany
Curado con EPCLUSA

 **EPCLUSA®**
sofosbuvir/velpatasvir
Comprimidos de 400 mg/100 mg

La cura de la hepatitis C puede ser asequible con EPCLUSÀ

La mayoría de las personas con cualquier tipo de seguro tienen cobertura para EPCLUSÀ o su medicamento genérico autorizado. El medicamento genérico autorizado también está cubierto a un costo de bolsillo bajo. Eso significa que puede centrarse en conseguir una cura, no en el costo.



Medicaid

\$0

La mayoría de las personas que tienen cobertura de Medicaid pagan **\$0 por todo el tratamiento.***



Medicare



EPCLUSÀ está cubierto por los planes de Medicare



Planes de seguro médico



La mayoría de los planes de seguro médico cubren EPCLUSÀ y su medicamento genérico autorizado.



Los pacientes sin seguro médico todavía pueden recibir tratamiento con EPCLUSÀ. Para ver si reúne los requisitos, llame a Support Path® al **1-855-7-MYPATH (1-855-769-7284)** o visite MySupportPath.com para obtener más información

El medicamento genérico autorizado de EPCLUSÀ (comprimidos de 400 mg/100 mg de sofosbuvir/velpatasvir) tienen los mismos componentes exactos que EPCLUSÀ, funciona de la misma manera y tiene el mismo perfil de seguridad, pero su envase es distinto.

* Basado en los datos de 2025 de Gilead Sciences sobre la cobertura de pacientes con Medicaid.

El Programa de ahorro con los copagos puede convertir en realidad la consecución de tratamiento para la hepatitis C

Si es elegible, las personas que tienen un seguro privado podrían pagar tan solo **\$5 por copago* con el Programa de ahorro con los copagos**. Llame hoy a un representante del programa Support Path® al 1-855-7-MYPATH (1-855-769-7284) para obtener más información.



Escanee aquí o visite EPCLUSÀ.com/sign-up-eligibility para comprobar su elegibilidad hoy.

* El apoyo con los copagos está disponible exclusivamente para los pacientes con seguro privado que califiquen. Podrían aplicar restricciones adicionales. Sujeto a cambiar. Para conocer todos los términos y las condiciones, visite www.mysupportpath.com. Esto no es un seguro médico. Solamente se acepta en las farmacias participantes.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSÀ?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la infección de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSÀ dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma EPCLUSÀ con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.
- **Informe al proveedor de atención médica y al farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSÀ y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

Por favor, vea los [Datos importantes de EPCLUSÀ](#), incluidas las [Advertencias importantes](#).

 **EPCLUSÀ®**
sofosbuvir/velpatasvir
Comprimidos de 400 mg/100 mg

Cómo tomar EPCLUSA



Tome un comprimido todos los días con o sin alimentos durante 12 semanas.

¿Qué debo saber acerca de tomar EPCLUSA?

- Saltar una dosis disminuye la cantidad de medicamento en sangre
- No deje de tomar EPCLUSA sin hablar primero con su proveedor de atención médica
- Si toma demasiado EPCLUSA, llame a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato al Departamento de Emergencias
- Si toma EPCLUSA con ribavirina, lea la guía de ambos medicamentos para obtener información sobre el embarazo, la anticoncepción y la infertilidad
- EPCLUSA viene de una farmacia especializada en tres frascos (cada frasco proporciona un mes de tratamiento)
 - El medicamento genérico autorizado de EPCLUSA viene en cartones alveolados en vez de frascos

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?

Entre los efectos secundarios graves, también pueden incluirse los siguientes:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSA y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: se desmaya o está a punto de desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.

Por favor, vea los Datos importantes de EPCLUSA, incluidas las Advertencias importantes.

Un comprimido, una vez al día, un paso más cerca de la cura de la hepatitis C

Es importante que tome **EPCLUSA todos los días durante 12 semanas**. La creación de una rutina facilitará que se mantenga en el camino correcto. A continuación damos unos cuantos consejos:



Configure una alarma como aviso diario para tomar EPCLUSA



Conserve EPCLUSA en su envase original



Tome EPCLUSA a la misma hora todos los días

Con el tratamiento de la hepatitis C, lo más importante que puede hacer es tomar su medicamento exactamente como le ha indicado su proveedor de atención médica.

Pensé que el tratamiento interrumpiría mi vida, pero un comprimido al día fue fácil.

Sammy
Curado con EPCLUSA



EPCLUSA®
sofosbuvir/velpatasvir
Comprimidos de 400 mg/100 mg



Entender los efectos secundarios fue importante para mí. Conversé con mi médico sobre EPCLUSA.

Benjamín
Curado con EPCLUSA

Comprensión de los efectos secundarios más frecuentes

En los ensayos clínicos, los efectos secundarios más frecuentes que presentó la gente fueron: **dolor de cabeza** y **cansancio**. A continuación damos algunos consejos sobre cómo puede manejarlos:



Dolor de cabeza

- Beba agua
- Intente descansar y relajarse
- Limite el consumo de café, té y refrescos con cafeína



Cansancio

- Haga sus tareas más pesadas cuando tenga más energía
- Intente tomar pequeñas siestas, de 20 minutos o menos, y no próximo a la hora de acostarse

Cuando personas con cirrosis avanzadas usan EPCLUSA con ribavirina, los efectos secundarios más frecuentes también incluyen: cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA? (cont.)

- Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se usa con ribavirina, en adultos con cirrosis descompensada son cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame al médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios.

Se le anima a comunicar a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta médica. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Por favor, vea los Datos importantes de EPCLUSA, incluidas las Advertencias importantes.

Antes de tomar EPCLUSA

Mantenga una lista de sus medicamentos. EPCLUSA y otros medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios. Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos de venta con receta médica, los medicamentos de venta sin receta y suplementos que toma.

Si tiene diabetes, toma medicación para la diabetes o warfarina, informe a su proveedor de atención médica para el control adecuado.

Informe a su médico si recibe tratamiento para cualquiera de los siguientes problemas:

Indigestión, acidez estomacal o úlceras en el estómago (medicamentos antiácidos)
Consulte la siguiente página

Ritmo cardíaco anormal (antiarrítmicos)
amiodarona (Cordarone[®],
Nexterone[®], Pacerone[®]);
digoxina (Lanoxin[®])

Cáncer (medicamentos contra el cáncer)
topotecán (Hycamtin[®])

Convulsiones o epilepsia (anticonvulsivantes)
carbamazepina (Carbatrol[®],
Epitol[®], Equetro[®], Tegretol[®]);
fenitoína (Dilantin[®], Phenytek[®]); o
fenobarbital (Luminal[®])

VIH (antirretrovíricos)
Cualquier medicamento que contenga tenofovir disoproxilo fumarato, incluidos: ATRIPLA[®], COMPLERA[®],² STRIBILD[®],³ TRUVADA[®],⁴ VIREAD[®]; efavirenz (Sustiva[®]); tipranavir (Aptivus[®]) utilizados en combinación con ritonavir (Norvir[®])

Tuberculosis (antimicobacterianos)
rifabutina (Mycobutin[®]); rifampicina (Rifadin[®], Rifamate[®], Rifater[®], Rimactane[®]); rifapentina (Priftin[®])

Colesterol (estatinas)
rosuvastatina (Crestor[®]); atorvastatina (Lipitor[®])

Otras afecciones (suplementos a base de hierbas)
Hierba de San Juan o un producto que contenga hierba de San Juan

Si toma medicamentos para problemas gastrointestinales (GI), considere lo siguiente:

| Nombres comerciales comunes | Recomendación |
|---|--|
| Mylanta[®] Maalox TC[®] Otros antiácidos que contiene hidróxido de magnesio o aluminio | Tómelo 4 horas antes o 4 horas después de EPCLUSA. |
| Pepcid[®] (famotidina) Tagamet[®] (cimetidina) Axid[®] (nizatidina) Zantac[®] (ranitidina) | Hable con su proveedor de atención médica sobre la dosis y cómo tomarla. Por ejemplo, se puede tomar famotidina al mismo tiempo que EPCLUSA o con un intervalo de 12 horas a una dosis no superior a 40 mg dos veces al día. |
| Prilosec[®] (omeprazol) Prevacid[®] (lansoprazol) Nexium[®] (esomeprazol) AcipHex[®] (rabeprazol) Protonix[®] (pantoprazol) | No se recomienda tomar EPCLUSA con Prilosec [®] (omeprazol) u otros inhibidores de la bomba de protones. Si desde el punto de vista médico se considera que es necesario que tome los dos medicamentos, se debe tomar EPCLUSA con alimentos, 4 horas antes de tomar Prilosec 20 mg. No se ha estudiado el uso de EPCLUSA con otros inhibidores de la bomba de protones. |

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA? EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, entre otros:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de comenzar el tratamiento con EPCLUSA, el proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si existe una infección por hepatitis B. Si alguna vez usted ha tenido hepatitis B, este virus podría reactivarse durante el tratamiento con EPCLUSA y después. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después del tratamiento con EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos importantes de EPCLUSA, incluidas las **Advertencias importantes**.

¹efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxilo fumarato; ²emtricitabina/rilpivirina/tenofovir disoproxilo fumarato; ³elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxilo fumarato; ⁴emtricitabina/tenofovir disoproxilo fumarato; ⁵tenofovir disoproxilo fumarato.

Puede tomar EPCLUSA con otros medicamentos determinados

Puesto que **no se esperan interacciones**, EPCLUSA se puede tomar durante el tratamiento con **otros medicamentos determinados**, entre otros:



Terapias médicaamente asistidas, incluidos buprenorfina/naloxona, metadona y naltrexona



Determinados medicamentos anticonceptivos



Muchos otros medicamentos

No empiece a tomar un medicamento nuevo sin informar a su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica puede decirle si es seguro tomar EPCLUSA con otros medicamentos.


¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSA?

- **Informe al proveedor de atención médica y al farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

Por favor, vea los Datos importantes de EPCLUSA, incluidas las **Advertencias importantes**.

Con independencia de que esté o no en recuperación, EPCLUSA puede curar la hepatitis C.

Kasey
Curado con EPCLUSA



EPCLUSA®
sofosbuvir/velpatasvir
Comprimidos de 400 mg/100 mg

Preguntas frecuentes



¿Puedo tomar EPCLUSA con medicamentos para recuperación de la adicción?

Sí, EPCLUSA se puede tomar mientras se toman medicamentos para recuperación de la adicción, incluidos buprenorfina/naloxona, metadona y naltrexona. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma antes de iniciar EPCLUSA.



¿Cómo surtir mi receta de EPCLUSA?

Si usted y su proveedor de atención médica deciden que EPCLUSA es adecuado para usted, su proveedor de atención médica le enviará su prescripción a una farmacia especializada. Las farmacias especializadas proporcionan medicamentos que tienen requisitos especiales de entrega, conservación o administración. Normalmente, los medicamentos se entregan a los pacientes mediante correspondencia.



¿Cómo debo conservar EPCLUSA?

- Conserve EPCLUSA a temperatura ambiente a una temperatura inferior a 86 °F (30 °C).
- Conserve EPCLUSA en su envase original.
- No use EPCLUSA si el sello de la boca del frasco está roto
- Mantenga EPCLUSA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.



¿Por qué es importante mantener las 12 semanas de tratamiento con EPCLUSA?

El virus de la hepatitis C crea cada día billones de copias de sí mismo en el cuerpo. Los medicamentos contra la hepatitis C impiden que el virus siga replicándose. Una vez que deja de hacer copias, muere. Por lo tanto, mantener el tratamiento de EPCLUSA el periodo completo de tratamiento le da las mejores posibilidades de luchar contra el virus. Es importante que no se salte ni omita ninguna dosis de EPCLUSA durante el tratamiento.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSA? (cont.)

• Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones

médicas, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la infección de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.

Por favor, vea los [Datos importantes de EPCLUSA](#), incluidas las [Advertencias importantes](#).



¿Qué debo hacer si me salto una dosis de EPCLUSA?

Es importante que tome EPCLUSA según se lo haya recetado su proveedor de atención médica. Si se salta una dosis, llame de inmediato a su proveedor de atención médica. Saltar una dosis disminuye la cantidad de medicamento en el cuerpo. Si toma demasiado EPCLUSA, llame a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato al Departamento de Emergencias.




¿Cuando termine el tratamiento, ¿cuánto tiempo pasará hasta saber si estoy curado?

Una persona se considera que se ha curado de la hepatitis C cuando no se puede detectar el virus en la sangre al medirlo al menos 3 meses después de que finalice el tratamiento. El médico realizará un análisis de sangre para determinar si el tratamiento fue exitoso.



¿Cómo puedo evitar contraer de nuevo la hepatitis C?

La hepatitis C se propaga principalmente por el contacto sanguíneo. Actividades como compartir agujas o equipo de drogas, mantener relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis C o usar equipo de tatuajes no sanitario pueden aumentar su riesgo de contraer nuevamente la hepatitis C.



Para adultos que tienen hepatitis C crónica de los genotipos 1-6



Está listo para tratar la hepatitis C

EPCLUSÀ está en su esquina

Pacientes reales, que se han curado con EPCLUSÀ y han sido compensados por Gilead.



Escanee aquí para visitar EPCLUSÀ.com

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSÀ? EPCLUSÀ puede causar efectos secundarios graves, entre otros:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de comenzar el tratamiento con EPCLUSÀ, el proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si existe una infección por hepatitis B. Si alguna vez usted ha tenido hepatitis B, este virus podría reactivarse durante el tratamiento con EPCLUSÀ y después. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después del tratamiento con EPCLUSÀ.

Por favor, vea los Datos importantes de EPCLUSÀ, incluidas las Advertencias importantes.

EPCLUSÀ, el logotipo de EPCLUSÀ, SUPPORT PATH, el logotipo de SUPPORT PATH, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. El medicamento genérico autorizado de EPCLUSÀ está comercializado por Aseuga Therapeutics LLC.

©2025 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-EPCC-0317 11/25

