



EPCLUSA FUE MI TIPO DE CURA PARA LA HEPATITIS C

Hable hoy con su especialista en la hepatitis C.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba tres meses después de terminar el tratamiento.

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (hep C) crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se utiliza conjuntamente con ribavirina.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante sobre la reactivación de la hepatitis B**, en la página 10.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets



“QUERÍA QUE ME
DESAPARECIERA
LA HEPATITIS C.”

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante y después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica le monitoreará durante y después de recibir EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 10.

EPCLUSA PODRÍA SER SU TIPO DE CURA

98%
TASA DE CURA

EPCLUSA tiene una tasa general de cura del 98% en los 6 genotipos principales evaluados en los estudios clínicos.*

EPCLUSA podría ser su tipo de cura para su tipo de hepatitis C. La mayoría de las personas toman un comprimido una vez al día durante 12 semanas, con o sin alimentos.†

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba tres meses después de terminar el tratamiento.

Hable hoy sobre EPCLUSA con su especialista en la hepatitis C.



Para obtener más información, llame al **1-844-4-EPCLUSA (1-844-437-2587)** o visite **EPCLUSA.com**.

*En tres estudios clínicos distintos con un total combinado de 1558 pacientes afectados por los genotipos 1-6 de la hepatitis C, con o sin tratamiento previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), quienes recibieron EPCLUSA, una pauta de tratamiento diferente, o un placebo, el 98% (1015/1035) de todos los pacientes que recibieron EPCLUSA una vez al día durante 12 semanas estaban curados.

Estos estudios no incluyeron a pacientes con cirrosis avanzada (descompensada).‡

†Se recomienda EPCLUSA con ribavirina para pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada).‡ **Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.**

‡Cirrosis avanzada (descompensada) es cuando el hígado presenta cicatrización extensa y ya no puede funcionar con eficacia.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

UN AVANCE IMPORTANTE EN LA TERAPIA CONTRA LA HEPATITIS C

EPCLUSA incluye sofosbuvir, el medicamento que ayudó a transformar el tratamiento de la hepatitis C. Con EPCLUSA, sofosbuvir junto a otro medicamento, velpatasvir, se combinan en un comprimido, creando así el primer tratamiento para la hepatitis C indicado para los seis genotipos principales del virus de la hepatitis C.

Los fabricantes de HARVONI® (ledipasvir y sofosbuvir) son quienes le ofrecen EPCLUSA. HARVONI revolucionó el tratamiento de la hepatitis C para adultos afectados con el genotipo 1 del virus de la hepatitis C y se ha recetado a más de medio millón de personas.*

*Esta información procede de los datos de IMS NPA, IMS NSP™, e IntegriChain®. Los datos reflejan un estimado del número de pacientes que recibieron HARVONI desde diciembre de 2013 a marzo de 2018.

¿Qué es HARVONI?

HARVONI es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (hep C) crónica (de larga duración), genotipos (GT) 1, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes infectados por el GT 1 y cirrosis avanzada (descompensada) o con los genotipos 1 o 4 con o sin cirrosis (compensada) que recibieron un trasplante de hígado, HARVONI se usa con ribavirina.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA y HARVONI, incluida la **Advertencia Importante**, en las páginas 10 y 11.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir EPCLUSA?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre HARVONI?

HARVONI puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con HARVONI, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante y después del tratamiento con HARVONI. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica le monitoreará durante y después de recibir HARVONI.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir HARVONI?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B o problemas de hígado distintos de la hepatitis C, o si ha recibido un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si HARVONI dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma HARVONI con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.
- **Informe a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico sobre todos los medicamentos que usa**, incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. HARVONI y determinados otros medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HARVONI?

Los efectos secundarios graves también pueden incluir:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** HARVONI, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta, que en algunos casos ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con HARVONI y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: desvanecimiento o estar a punto de desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.

Los efectos secundarios más frecuentes de HARVONI incluyen cansancio, dolor de cabeza y debilidad.



Para la mayoría de las personas


SOLO UN COMPRIMIDO,
UNA VEZ AL DÍA,
DURANTE 12 SEMANAS.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir EPCLUSA? (continuación)

- Informe a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico sobre todos los medicamentos que usa, incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 10.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets



MUY EFICAZ CONTRA LOS 6 GENOTIPOS PRINCIPALES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

En estudios clínicos, el tratamiento con EPCLUSA durante 12 semanas ha resultado en altas tasas de cura en la mayoría de las personas:

- Con o sin cirrosis compensada
- Con o sin tratamiento previo para la hepatitis C

GENOTIPO	DOSIS	TASA DE CURA
1	 Un comprimido al día 12 SEMANAS DE TRATAMIENTO	98%*
2		99%†
3		95%‡
4		100%*
5		97%*
6		100%*

Esta información no aplica a los pacientes con cirrosis avanzada (descompensada), que es cuando el hígado presenta cicatrización extensa y ya no puede funcionar con eficacia. Consulte más información sobre este tipo de paciente en la página 6.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba tres meses después de terminar el tratamiento.

*En un estudio realizado con 740 pacientes infectados por los genotipos 1, 2, 4, 5 o 6 de la hepatitis C, con o sin tratamiento previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), que recibieron EPCLUSA o placebo durante 12 semanas, el 98% (323 de 328) de los pacientes infectados con el genotipo 1, el 100% (116 de 116) de los pacientes infectados por el genotipo 4, el 97% (34 de 35) de los pacientes infectados por el genotipo 5 y el 100% (41 de 41) de los pacientes infectados por el genotipo 6, que recibieron EPCLUSA una vez al día durante 12 semanas, estaban curados.

†En un estudio realizado con 266 pacientes infectados por el genotipo 2 de la hepatitis C, con o sin tratamiento previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), que recibieron EPCLUSA o sofosbuvir + ribavirina durante 12 semanas, el 99% (133 de 134) de todos los pacientes que recibieron EPCLUSA una vez al día durante 12 semanas estaban curados.

‡En un estudio realizado con 552 pacientes infectados por el genotipo 3 de la hepatitis C, con o sin tratamiento previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), que recibieron EPCLUSA durante 12 semanas o sofosbuvir + ribavirina durante 24 semanas, el 95% (264 de 277) de los pacientes que recibieron EPCLUSA una vez al día durante 12 semanas estaban curados. Las tasas de cura para EPCLUSA variaron del 89% (con tratamiento previo para la hepatitis C y con cirrosis) al 98% (sin tratamiento previo para la hepatitis C y sin cirrosis).



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?


Los efectos secundarios graves también pueden incluir:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSA y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: desvanecimiento o estar a punto de desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.
- Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se usa con ribavirina, en adultos con cirrosis descompensada son: cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 10.

“LA HEPATITIS C
ME CAUSÓ
DAÑOS
HEPÁTICOS.”



¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante y después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluida insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica le monitoreará durante y después de recibir EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 10.

EPCLUSA PUEDE TRATAR UNA **AMPLIA DIVERSIDAD** DE PERSONAS

Las personas que tienen hepatitis C y el VIH-1 y las personas con hepatitis C y cirrosis avanzada (descompensada)* pueden recibir tratamiento con una pauta de EPCLUSA para su hepatitis C.

TIPO DE PACIENTE	PAUTA DE TRATAMIENTO CON EPCLUSA
Genotipos 1-6 del virus de la hepatitis C con VIH-1	12 semanas
Genotipos 1-6 del virus de la hepatitis C con cirrosis avanzada*	12 semanas con la adición de ribavirina

Es importante que hable con su proveedor de atención médica sobre el/los medicamento(s) antirretrovírico(s) para el VIH para entender las posibles interacciones con EPCLUSA o si tiene alguna otra pregunta sobre su pauta de tratamiento.

Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.

*Cirrosis avanzada (descompensada) es cuando el hígado presenta cicatrización extensa y ya no puede funcionar con eficacia.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

CUBIERTO POR LA MAYORÍA DE LOS PLANES DE SEGURO

Mientras considera el tratamiento con EPCLUSA, es posible que se pregunte por la cobertura de su seguro o el pago del tratamiento.

Los representantes en directo del programa **Support Path** le pueden ayudar a entender su cobertura de seguro y explicarle las posibles opciones para ahorrar gastos.



Llame hoy a un **representante del programa Support Path** al **1-855-7-MYPATH** (1-855-769-7284)

CUPÓN PARA COPAGO DE EPCLUSA

El cupón para copago de EPCLUSA puede ayudar a reducir el costo de bolsillo del tratamiento para las personas que reúnan los requisitos.

Llame a un **representante del programa Support Path** o visite [EPCLUSA.com/support-path](https://www.epclusa.com/support-path) para determinar si reúne los requisitos así como todos los términos y las condiciones del programa.



Las personas que reúnan los requisitos pueden pagar tan solo

\$5 POR COPAGO*

*Aplican restricciones.

Usted no reúne los requisitos si está inscrito en un programa de salud gubernamental para medicamentos de venta con receta médica, tal como Medicaid o Medicare Parte D (incluido cuando tiene un intervalo en la cobertura, conocido como el “donut hole”, o el agujero de la rosquilla).

Incluso si no reúne los requisitos para recibir el cupón para el copago, llame a un representante del programa Support Path para obtener información sobre otros recursos financieros que podrían estar a su disposición.



“ACABO DE
DESCUBRIR
QUE
TENGO
HEPATITIS C.”

¿Qué debo decir a mi proveedor de atención médica antes de recibir EPCLUSA?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 10.

TENGA A UN EXPERTO A SU LADO

Hable hoy con un especialista en hepatitis C acerca de cómo tratar su hepatitis C con EPCLUSA. A continuación presentamos algunas preguntas para ayudarle a iniciar la conversación:

- ¿EPCLUSA es adecuado para mí?
- ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EPCLUSA?
- ¿Sus otros pacientes han conseguido curar la hepatitis C que tenían con EPCLUSA?
- ¿Cuánto tiempo tomará descubrir si estoy curado?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?

Exprésese y no tenga miedo de preguntar. Explique cómo le hace sentir la hepatitis C y proporcione información lo más específica posible.

Recuerde, usted es su mejor defensor.



Visite [EPCLUSA.com](https://www.epclusa.com) para encontrar un especialista en la hepatitis C cerca de usted.

Se le anima a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta médica a la FDA. Visite [www.FDA.gov/medwatch](https://www.fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-FDA-1088.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

ES POSIBLE QUE CALIFIQUE PARA PAGAR
TAN SOLO \$5 POR COPAGO.
APLICAN RESTRICCIONES.
VISITE EPCLUSA.COM

Para obtener más información
sobre EPCLUSA, llame al:
1-844-4-EPCLUSA

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la
Advertencia Importante sobre la reactivación de la hepatitis B, en la página 10.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

La reactivación del virus de la hepatitis B:

Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante o después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Su proveedor de atención médica le monitoreará si está en riesgo de que se le reactive el virus de la hepatitis B durante y después de suspender EPCLUSA.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

• **Aquellos en la sección “Información más importante sobre EPCLUSA”.**

• **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone[®], Nexterone[®], Pacerone[®]), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta, lo cual en algunos casos ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se toma amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Consiga ayuda médica inmediatamente si toma amiodarona junto con EPCLUSA y presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- se desmaya o está a punto de desmayarse
- mareos o aturdimiento
- no se siente bien
- debilidad
- cansancio extremo
- disnea
- dolor en el pecho
- confusión
- problemas de memoria

Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA incluyen:

dolor de cabeza y cansancio en adultos y niños de 6 años de edad y mayores. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se usa con ribavirina, en adultos con cirrosis descompensada son: cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA en niños menores de 6 años son vómitos y problemas por escupir el medicamento.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre EPCLUSA y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica acerca de su afección y su tratamiento.

ACERCA DE EPCLUSA

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos y niños de 3 años de edad o más que tienen la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se utiliza junto con ribavirina. EPCLUSA contiene los dos medicamentos: sofosbuvir y velpatasvir. Se desconoce si EPCLUSA es seguro y eficaz en niños menores de 3 años.

ANTES DE TOMAR EPCLUSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Ha tenido alguna vez la hepatitis B
- Tiene problemas de hígado distintos de la hepatitis C
- Ha tenido un trasplante de hígado
- Tiene problemas renales o está en diálisis
- Tiene el VIH-1
- Está embarazada o amamantando o planea quedar embarazada o amamantar
 - Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma:

- Mantenga una lista que incluya todos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas, y enséñesela a su proveedor de atención médica.
- EPCLUSA y determinados medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de la información importante sobre EPCLUSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.
- Visite EPCLUSA.com o llame al 1-844-4-EPCLUSA.
- Para obtener información sobre posibles ahorros, llame al 1-855-7-MYPATH o visite EPCLUSA.com.



(jar-VO-ni)

INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE HARVONI

HARVONI puede causar efectos secundarios graves, incluida:

La reactivación del virus de la hepatitis B:

Antes de iniciar el tratamiento con HARVONI, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante o después del tratamiento con HARVONI. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Su proveedor de atención médica le monitoreará si está en riesgo de que se le reactive el virus de la hepatitis B durante y después de suspender HARVONI.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE HARVONI

HARVONI puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Aquellos en la sección “Información más importante sobre HARVONI”.**
- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** HARVONI, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta, lo cual en algunos casos ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos. Consiga ayuda médica inmediatamente si toma amiodarona junto con HARVONI y presenta cualquiera de los siguientes síntomas:
 - se desmaya o está a punto de desmayarse
 - mareos o aturdimiento
 - no se siente bien
 - debilidad
 - cansancio extremo
 - disnea
 - dolor en el pecho
 - confusión
 - problemas de memoria

Los efectos secundarios más frecuentes de HARVONI incluyen: cansancio, dolor de cabeza y debilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de HARVONI. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre HARVONI y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica acerca de su afección y su tratamiento.

ACERCA DE HARVONI

HARVONI es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos y niños de 3 años o más que tienen hepatitis C (hep C) crónica (de larga duración), genotipos (GT) 1, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes afectados por el GT 1 y cirrosis avanzada (descompensada) o con los genotipos 1 o 4 con o sin cirrosis (compensada) que recibieron un trasplante de hígado, HARVONI se usa con ribavirina.

ANTES DE TOMAR HARVONI

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Ha tenido alguna vez la hepatitis B
- Tiene problemas de hígado distintos de la hepatitis C
- Le han hecho un trasplante de hígado
- Tiene problemas renales o está en diálisis
- Tiene el VIH-1
- Está embarazada o amamantando o planea quedar embarazada o amamantar
 - Si toma HARVONI con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que usted toma:

- Mantenga una lista que incluya todos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas, y enséñesela a su proveedor de atención médica.
- HARVONI y determinados medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de la información importante sobre HARVONI. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.
- Visite HARVONI.com o llame al 1-844-READY41.
- Para obtener información sobre posibles ahorros, llame al 1-855-7-MYPATH o visite HARVONI.com/support.



EPCLUSA, el logotipo de EPCLUSA, HARVONI, el logotipo de HARVONI, SUPPORT PATH, el logotipo de SUPPORT PATH, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2021 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. PTFC0565 08/21